

Tato Karta pacienta obsahuje důležité bezpečnostní informace, které musíte znát, pokud se léčíte přípravkem Aubagio. Úplné informace naleznete v Příbalové informaci pro pacienta.



Obecné pokyny

Předložte tuto kartu každému lékaři nebo zdravotnickému pracovníkovi, který Vám bude poskytovat lékařskou péči (např. při návštěvě pohotovosti).

AUBAGIO

teriflunomid

Jméno pacienta: _____

Datum prvního předepsání
přípravku Aubagio: _____

Název centra: _____

Jméno ošetřujícího lékaře: _____

Telefonní číslo ošetřujícího lékaře: _____

www.sanofi.cz

sanofi-aventis, s.r.o.
Evropská 846/176a, 160 00 Praha 6
Tel.: 233 086 111 | Fax: 233 086 222
www.sanofi.cz

Datum poslední revize materiálu: 07/2021
Verze: 1.1
Schváleno SÚKL: 07/2021

AUBAGIO

teriflunomid



Důležité nežádoucí účinky

Tento lék může ovlivnit funkci jater, krevní tlak a určité buňky v krvi, které jsou důležité pro boj s infekcemi.

Pokud se u Vás vyskytne některý z níže uvedených nežádoucích účinků, okamžitě kontaktujte svého lékaře:

- Zežloutnutí kůže nebo očí, tmavá moč, nevolnost nebo zvracení a bolest břicha. V takovém případě můžete mít problémy s játry.
- Vysoká teplota (horečka), kašel, zimnice, otoky uzlin, bolestivé močení nebo snížený proud moči nebo zmatenost. V takovém případě můžete mít infekční onemocnění.

Tento přehled nežádoucích účinků není úplný a je třeba se seznámit i s možnými dalšími nežádoucími účinky, jejichž výčet naleznete v Příbalové informaci pro pacienta. Příbalová informace pro pacienta (PIL) je distribuována v každém balení léčivého přípravku a lze ji také vyhledat na <http://www.olecich.cz//> po zadání názvu léčivého přípravku pod zkratkou PIL.



Pro ženy ve fertilním věku včetně dívek a jejich rodičů/ zákonných zástupců

- Nezačínajte léčbu přípravkem Aubagio, pokud jste těhotná nebo se domníváte, že můžete být těhotná. Lékař Vás může vyzvat, abyste pro ověření podstoupila těhotenský test.
- Během léčby přípravkem Aubagio a po jeho použití použijte spolehlivou a účinnou metodu antikoncepce. Lékař vás bude informovat o možných rizicích pro plod a o potřebě účinné antikoncepce.
- Kontaktujte svého lékaře, jestliže chcete změnit antikoncepční metodu nebo chcete otěhotnět
- Pokud otěhotníte nebo se budete domnívat, že jste těhotná, zastavte užívání přípravku Aubagio a **kontaktujte ihned svého lékaře**. Zároveň upozorněte lékaře, aby kontaktoval koordinátora Národního registru v dané zemi, který zajišťuje zařazení pacientek do těhotenského registru.
- V případě těhotenství může lékař navrhnout léčbu určitými léky, které umožní přípravek Aubagio rychle a dostatečně odstranit z Vašeho těla.
- Poradte se také se svým lékařem, pokud plánujete kojení nebo kojíte.

Pro rodiče / zákonné zástupce nebo dívky: kontaktujte svého lékaře, POKUD SE U PACIENTKY POPRVÉ OBJEVÍ MENSTRUACE, abyste získali rady, týkající se možného rizika pro plod a potřeby antikoncepce.

Pokud se u Vás vyskytne kterýkoli z nežádoucích účinků, sdělte to svému lékaři nebo lékárníkovi. Stejně postupujte i v případě jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny v příbalové informaci. Nežádoucí účinky můžete hlásit také přímo prostřednictvím národního systému hlášení nežádoucích účinků. Podrobnosti o hlášení najdete na: www.olecich.cz/hlaseni-pro-sukl/ nahlasit-nezadouci-ucinek

Adresa pro zaslání je Státní ústav pro kontrolu léčiv, oddělení farmakovigilance, Šrobárova 48, Praha 10, 100 41, e-mail: farmakovigilance@sukl.cz.

Nahlášením nežádoucích účinků můžete přispět k získání více informací o bezpečnosti tohoto přípravku.

Tato informace může být také hlášena společnosti sanofi-aventis, s.r.o.