

**Intravenózní železo** se používá k léčbě nedostatku železa v případě, že jsou ústy podávané přípravky neúčinné nebo je nelze použít.

**Intravenózní železo** může způsobit alergické reakce a musí je podávat osoby vyškolené pro posouzení a zvládnutí těchto reakcí.

U některých pacientů mohou být tyto alergické reakce závažné nebo život ohrožující (tzv. anafylaktické reakce) a mohou způsobit problémy se srdcem a krevním tlakem a/nebo mohou být příčinou mdloby či ztráty vědomí.

#### **Hlášení nežádoucích účinků**

Pokud se u Vás vyskytne kterýkoli z nežádoucích účinků, sdělte to svému lékaři nebo zdravotní sestře. Stejně postupujte v případě jakýchkoli nežádoucích účinků, a to i tehdy, když nejsou uvedeny v této příbalové informaci. Nežádoucí účinky můžete hlásit také přímo Státnímu ústavu pro kontrolu léčiv, Šrobárova 48, 100 41 Praha 10, webové stránky: <http://www.olecich.cz/hlaseni-pro-sukl/nahlasit-nezadouci-ucinek>, e-mail: [farmakovigilance@sukl.cz](mailto:farmakovigilance@sukl.cz).

# **Intravenózní železo**

**Důležité informace pro pacienty o možném riziku závažných alergických reakcí způsobených intravenózním železem (léčivý přípravek podávaný jehlou do žíly)**

▼ Tento přípravek podléhá dalšímu sledování. To umožní rychlé získání nových informací o bezpečnosti. Můžete přispět tím, že nahlásíte jakékoli nežádoucí účinky, které se u Vás vyskytnou.

Tyto informace pro Vás připravili a poskytují Vám je výrobci intravenózního železa v Evropě.

**Pečlivě si tuto příbalovou informaci přečtěte a případné otázky, které máte, prodiskutujte se svým lékařem.**

**Zvýšené riziko alergické reakce se u Vás může vyskytnout, pokud máte:**

- - prokázanou alergii včetně alergií na léky,
- závažné astma, ekzém nebo jiné alergie v anamnéze (například alergie na prach, pyl, kožní šupiny domácích zvířat) nebo
- poruchu imunitního systému či zánětlivá onemocnění (například revmatoidní artritidu, lupus erythematodes a další).

**Dříve než Vám lékař předepíše nebo podá intravenózní železo, měli byste ho informovat,** pokud máte jakoukoli alergii nebo některé z těchto onemocnění.

Váš lékař rozhodne, zda pro Vás bude užívání přípravku větším přínosem než rizikem.

**Intravenózní železo by Vám nemělo být předepsáno ani podáno v těchto případech:**

- jste alergický(á) (hypersenzitivní) na daný přípravek nebo na kteroukoli další složku tohoto přípravku,
- v minulosti u Vás došlo k závažným alergickým (hypersenzitivním) reakcím na jinou intravenózní léčbu železem\*,
- máte nadměrnou zátěž železem (příliš mnoho železa v těle),
- Vaše anémie není způsobena nedostatkem železa.

**Dříve než Vám lékař předepíše nebo podá intravenózní železo, měli byste ho informovat,** pokud se u Vás již projevila některá z těchto alergií nebo onemocnění.

**\* Je důležité vědět, že se reakce může vyskytnout i v případě, že jste v minulosti žádné potíže s intravenózním železem neměli.**

**Těhotenství:** Intravenózní železo se nesmí podávat v těhotenství, pokud to není zcela nezbytné. Pokud jste těhotná nebo se domníváte, že můžete být těhotná, je důležité prodiskutovat to se svým lékařem.

**Svého lékaře nebo zdravotní sestru byste měli okamžitě kontaktovat v těchto případech:**

- máte v průběhu léčby intravenózním železem nebo po ní známky nebo příznaky alergické reakce.

Například: kopřivka nebo vyrážka, svědění, závrať, omámení, otok rtů, jazyka, hrdla nebo těla, dýchací potíže, krátký dech nebo sípot.

- Váš lékař u Vás bude sledovat případné známky a příznaky alergické reakce po dobu nejméně 30 minut po každém podání intravenózního železa.